

Епідемія кору в Україні



Кір – надзвичайно заразне гостре вірусне захворювання. Передається повітряно-крапельним шляхом.



Інкубаційний період – від 7 до 17 днів (протягом цього періоду ознаки можуть не проявлятися).



Люди, які хворіли кором, **мають імунітет** від хвороби на все життя.



Основний спосіб профілактики – щеплення, яке можна зробити як дітям, так і дорослим.

Симптоми кору



- Сильний головний біль
- Слабкість
- Температура до 40°C
- Відсутній апетит
- Нежить, сухий, болісний кашель
- Червоне, набрякле горло
- Збільшені шийні лімфовузли
- Запалення слизової оболонки ока (очі червоніють, з'являється сльозотеча, світлобоязнь, згодом з'являються гнійні виділення)

1-й
день



- Рожеві крапкові висипання на піднебінні
- Дрібні білі цятки на слизовій оболонці щік, ясен і губ

2-3-й
день



- Висип на тілі (численні дрібні червонуваті цятки і пухирці, які мають тенденцію до злиття й утворення більших плям):
 - – спочатку на шкірі голови, за вухами, на обличчі
 - – наступного дня – на тулубі
 - – ще через день – на руках і ногах
- Знову підвищується температура
- Підсилюються катаральні явища (нежить, кашель)
- Загострюється кон'юнктивіт

4-5-й
день

Якщо немає ускладнень, то із 4-го дня від початку висипань поліпшується стан здоров'я